

Przeciwwskazania do laserowej korekcji wzroku

Przeciwwskazaniem do wykonania laserowej korekcji wady wzroku są choroby ogólne takie jak: cukrzyca, choroby tkanki łącznej (tzw. kolagenozy) – np. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, sklerodermia, guzkowe zapalenie tętnic, zespół Sjogrena, choroby autoimmunologiczne (np. niektóre choroby tarczycy, zapalenie Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa), łuszczyca, sarkoidoza, choroby przebiegające z osłabieniem odporności organizmu, AIDS, atopia i silne alergie, trądzik różowaty, czynne choroby infekcyjne, osobnicza skłonność do tworzenia przerośniętych blizn- nazywanych bliznowcami, wszczepiony rozrusznik serca, padaczka, zaburzenia hormonalne.

Zabiegu nie można wykonać także w trakcie leczenia lekami immunosupresyjnymi, sterydami, Amiodaronem, Tamoksifenem, Warfinem, Izotretinoiną.

Laserowej korekcji nie można wykonywać też u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Względny przeciwwskazaniem jest wiek poniżej 21 lat – zabieg dopuszczalny w wyjątkowych sytuacjach, pod warunkiem stabilnej wady wzroku.

Przeciwwskazania okulistyczne to niestabilna wada wzroku, aktywne zapalenia oka, wirusowe zapalenie rogówki, półpasiec oczny, stożek rogówki lub inne zwyrodnienia rogówki, niektóre dystrofie rogówki, źle kontrolowany zespół suchego oka, choroby naczyniowe oka np. zapalenie tęczówki, krótkowzroczność zwyrodnieniowa postępująca, oczopląs, zaćma, jaskra, otwór w plamce, odwarstwienie siatkówki.